Информация о результатах проведения профилактического медицинского осмотра диспансеризации определенных групп взрослого населения ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» по итогам 2 квартала 2023 года



Проведено	**Подлежало**
3154	3150
Процент выполнения по профосмотрам 100 %	



Проведено	**Подлежало**
11281	11270
Процент выполнения по диспансеризации 100 %	

Гендерная структура осмотренных



В гендерной структуре при проведении профилактического осмотра преобладали женщины



В гендерной структуре при диспансеризации преобладали женщины

По социальному статусу

Трудоспособного возраста	8112-56%
Старше трудоспособного возраста	6323-44%



В возрастной структуре и среди женщин и среди мужчин преобладает молодой возраст 18-34 лет за счет охвата профилактическими медицинскими осмотрами. Увеличилось количество женщин трудоспособного возраста 40-54г в связи с направлением работодателями. В перспективе при организации информационной кампании с учетом выявления факторов риска развития ХНИЗ и самих заболеваний необходимо делать акцент на возрастную категорию 40-64г мужчин, в связи с высоким уровнем смертности от ХНИЗ данной категории населения, привлекать организации с преимущественно мужским контингентом сотрудников.

Сведения о выявленных патологических состояниях на первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

Расчет 14435 человек, прошедших диспансеризацию и профосмотр



Выводы – практически 2/3 прошедших 1 этап диспансеризации имели патологические отклонения в состоянии своего здоровья

На второй этап направлено 7552 человека.

Сведения о приемах(осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации



Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации на которые они были направлены по результатам первого этапа 7552 человек (100%)

Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации на которые они были направлены по результатам первого этапа 0 человек.

Сведения о выявленных при проведении ПМО и ДОГВН факторах риска и других патологических состояниях, и заболеваниях, повышающих вероятность развития ХНИЗ (далее факторы риска)

Выводы: среди факторов риска преобладают модифицируемые(поведенческие)

1 место- гиперхолистеринемия 44%

2 место –низкая физическая активность 38%

3 место-избыточная масса тела 32%

4 место-нерациональное питание-25%

Среди курящих преобладают мужчины трудоспособного возраста.

Впервые выявленные в ходе диспансеризации заболевания



В структуре впервые выявленных заболеваний преобладают болезни системы кровообращения

1 место - болезни системы кровообращения

2 место - сахарный диабет и болезни системы пищеварения

3 место - болезни органов зрения

Все пациенты с впервые выявленными заболеваниями взяты под диспансерное наблюдение (охват 100%)

Углубленная диспансеризация для лиц,перенесших НКВИ

Подлежало	1278 чел
Прошло	1656 чел

Выполнение плана составляет 131%

По результатам 1 этапа направлено на 2 этап углубленной диспансеризации 27 человек, все они прошли мероприятия 2 этапа, на которые были направлены в полном объеме.

Количество лиц с отклонениями от нормы, выявленных по результатам 1 этапа углубленной диспансеризации 615 человека, из них у 231 чел. по заключению терапевта выявлены постковидные осложнения. Все пациенты взяты под диспансерное

наблюдение и направлены на реабилитацию. Прошли реабилитационные мероприятия 231 человек.

Общие итоги диспансеризации и профилактического медицинского осмотра

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ

Группа здоровья 1	3554-24%
Группа здоровья 2	529-4%
Группа здоровья 3	10352-72%



Вывод: среди групп здоровья превалирует 3 группа, что связано с возрастным составом прикрепленного населения, страдающим хроническими заболеваниями, а также с недостаточно активным прохождением диспансеризации лиц трудоспособного возраста.

Пройдите диспансеризацию!

Узнайте все о своем здоровье!